

# Bioventis Infos

## **Changement de prise en charge du dosage de la vitamine D** (JO du 14/08/2014 applicable au 04/09/2014)

La prise en charge de cet acte est limitée aux situations suivantes:

- suspicion de rachitisme;
- suspicion d'ostéomalacie;
- suivi ambulatoire de l'adulte transplanté rénal au-delà de trois mois après transplantation;
- avant et après chirurgie bariatrique;
- évaluation et prise en charge des personnes âgées sujettes aux chutes répétées;
- respect des résumés des caractéristiques du produit (RCP) des médicaments préconisant la réalisation de l'acte 1139.

**Merci de renseigner l'indication sur la prescription.  
En absence d'informations l'acte sera à la charge du patient (HN).**

## **Détection des substances addictives dans les urines**

- les dépistages de drogues se font essentiellement sur les urines (les tests sanguins sont réservés à des fins de contrôles ou cas particuliers)
- les recueils se font au laboratoire (pour s'assurer de l'absence de fraude et substitution)
- les durées moyennes de détection des métabolites urinaires des substances addictives sont données à titre d'indication : de nombreux facteurs internes et externes peuvent influencer sur l'élimination.
- dans le cadre d'une recherche de drogue sans toxique identifié, les 4 familles les plus communément recherchées sont :  
Cocaïne, Opiacés, Cannabis, Amphétamine (COCA).

	produits	durée de détection dans les urines
<b>cannabinoïdes</b>	cannabis	fumeur occasionnel (1 à 2 cig/sem):7 jours fumeur régulier (5 à 6 cig/j) : 15 à 30 jours
<b>opiacés</b>	opium, morphine Héroïne codéine, codéthyline opioïdes synthétiques (buprénorphine, naloxone, méthadone)	2 à 5 jours (10 à 20 jours pour la pholcodine)
<b>cocaïniques</b>	Cocaïne	2 à 4 jours
<b>amphétamines et dérivés</b>	amphétamines métamphétamine MDMA (ecstasy) MDEA,MDA,MBDB	1 à 3 jours (7 jours pour la métamphétamine)
<b>tabac</b>	nicotine dérivés nicotiniques	3 à 8 jours